

МЕРА ПО СОХРАНЕНИЮ 219/XX
Ограничения на промысел *Champscephalus gunnari*
в Статистическом подрайоне 48.3 в сезоне 2001/02 г.

В соответствии с Мерой по сохранению 7/V Комиссия настоящим принимает следующую меру по сохранению:

- | | |
|----------------------|---|
| Доступ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Промысел <i>Champscephalus gunnari</i> в Статистическом подрайоне 48.3 проводится судами только с применением тралов. Применение донных тралов при направленном промысле <i>Champscephalus gunnari</i> в Статистическом подрайоне 48.3 запрещается. 2. Промысел <i>Champscephalus gunnari</i> запрещается в пределах 12 морских миль от берега Южной Георгии в период с 1 марта по 31 мая 2002 г. (период нереста). |
| Ограничение на вылов | <ol style="list-style-type: none"> 3. Общий вылов <i>Champscephalus gunnari</i> в Статистическом Подрайоне 48.3 в сезоне 2001/02 г. не превышает 5557 т. Общий вылов <i>Champscephalus gunnari</i> в период с 1 марта по 31 мая 2002 г. не превышает 1389 т. 4. Если в каком-либо улове имеется более 100 кг <i>Champscephalus gunnari</i>, и более 10% особей <i>Champscephalus gunnari</i> имеют общую длину меньше 240 мм, промысловое судно переходит на другой промысловый участок, удаленный не менее чем на 5 морских миль¹. В течение по крайней мере пяти суток² это судно не подходит ближе, чем на 5 морских миль к месту, где улов мелкой <i>Champscephalus gunnari</i> превысил 10%. Место, где улов мелкой <i>Champscephalus gunnari</i> превысил 10%, определяется как маршрут судна от точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до точки, где оно выбрало орудия лова. |
| Сезон | <ol style="list-style-type: none"> 5. Для тралового промысла <i>Champscephalus gunnari</i> в Статистическом подрайоне 48.3 сезон 2001/2002 г. определяется как период с 1 декабря 2001 г. по 30 ноября 2002 г. или до тех пор, пока не достигнуто ограничение на вылов, – в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Прилов | <ol style="list-style-type: none"> 6. В ходе данного промысла прилов регулируется положениями Меры по сохранению 95/XIV. Если в ходе направленного промысла <i>Champscephalus gunnari</i> прилов любого из видов, перечисленных в Мере по сохранению 95/XIV, за одно траление <ul style="list-style-type: none"> • превышает 100 кг и составляет больше 5% общего улова всей рыбы по весу, или • ≥ 2 т, то |

- судно переходит на другой промысловый участок, удаленный не менее чем на 5 морских миль¹. В течение по крайней мере пяти суток² это судно не подходит ближе, чем на 5 морских миль к месту, где объем прилова любого из видов, перечисленных в Мере по сохранению 95/XIV, превысил 5%. Место, где объем прилова превысил 5%, определяется как маршрут судна от точки, где судно в первый раз установило орудия лова, до точки, где оно выбрали орудия лова.
- Смягчающие меры
7. Данный промысел проводится в соответствии с Мерой по сохранению 173/XVIII с тем, чтобы свести к минимуму побочную смертность морских птиц в ходе этого промысла.
8. Как только на каком-либо судне поймано 20 морских птиц, оно прекращает промысел и ему запрещается дальнейшее участие в этом промысле в сезоне 2001/02 г.
- Наблюдатели
9. В ходе всех промысловых операций в течение промыслового сезона на борту каждого судна находится по крайней мере один научный наблюдатель, назначенный в соответствии с Системой АНТКОМа по международному научному наблюдению, и, по возможности, еще один научный наблюдатель.
- Данные: улов/усилие
10. Во исполнение настоящей меры по сохранению в сезоне 2001/02 г. применяется нижеследующее:
- (i) описанная в Мере по сохранению 51/XIX Система представления данных по уловам и промысловому усилию по пятидневным периодам; и
- (ii) описанная в Мере по сохранению 122/XIX Система ежемесячного представления мелкомасштабных данных по уловам и усилию. Мелкомасштабные данные представляются за каждый отдельный улов.
11. Во исполнение мер по сохранению 51/XIX и 122/XIX целевым видом является *Champscephalus gunnari*, а виды прилова определяются как все виды, иные нежели *Champscephalus gunnari*.
- Данные: биологические
12. Собираются и регистрируются требующиеся в рамках Меры по сохранению 121/XIX мелкомасштабные биологические данные. Эти данные представляются в соответствии с Системой международного научного наблюдения.
- Исследования
13. Каждое судно, занятое в этом промысле в течение периода с 1 марта по 31 мая 2002 г., проводит двадцать (20) научно-исследовательских тралений по методу, описанному в Приложении 219/A.

¹ Настоящее положение о минимальном расстоянии, разделяющем промысловые участки, принято в ожидании принятия Комиссией более подходящего определения термина «промышленный участок».

² Этот период принят в соответствии с отчетным периодом, указанным в Мере по сохранению 51/XIX, – в ожидании принятия Комиссией более подходящего периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 219/А

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТРАЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА НЕРЕСТА

1. Все промысловые суда, участвующие в промысле *Champscephalus gunnari* в Статистическом подрайоне 48.3 с 1 марта по 31 мая 2002 г., должны провести по крайней мере 20 научно-исследовательских траплений за этот период. Двенадцать траплений должно быть выполнено в районе скал Шаг – Черных скал. Они должны быть распределены по 4 секторам, показанным на рис. 1: по 4 в северо-западном и юго-восточном секторах и по 2 в северо-восточном и юго-западном секторах. Остальные 8 научно-исследовательских траплений должны быть проведены в северо-западной части шельфа Южной Георгии на глубинах менее 300 м, как показано на рис. 1.
2. Каждое научно-исследовательское трапление должно быть удалено от остальных по крайней мере на 5 морских миль. Расстояние между станциями устанавливается так, чтобы адекватно охватить оба района в целях получения информации о составе *Champscephalus gunnari* (по длине, полу, половозрелости и весу).
3. Помимо научно-исследовательских траплений должен вестись лов, если концентрации рыбы обнаружены по пути к Южной Георгии.
4. Продолжительность научно-исследовательских траплений должна быть не менее 30 мин. нахождения сети на промысловой глубине. Днем трапление должно проводиться около дна.
5. Находящийся на борту научный наблюдатель должен проводить выборку из уловов, полученных при всех научно-исследовательских траплениях. Пробы должны насчитывать не менее 100 особей, полученных по методу случайной выборки. Для всей рыбы в выборке надо определять по крайней мере длину, пол и половозрелость, и, по возможности, вес. При большом улове и наличии времени должно исследоваться больше особей.




Рис. 1: Распределение 20 тралений поискового промысла (звездочка)
Champsocephalus gunnari у скал Шаг (12) и Южной Георгии (8) с 1 марта по
31 мая 2002 г.